



Барбамил (Barbamylum), 5-изоамил-5-этилбарбитурат натрия. Белый аморфный порошок без запаха, легко растворим в воде. Гигроскопичен. Выпускается в таблетках по 0,1 или 0,5.

Высшая разовая доза 0,5г.

Высшая суточная доза 1г.

Применяется как снотворное по 0,1-0,2г за полчаса до сна при различных видах бессонницы. Сон наступает достаточно быстро и длится 6-8 часов. Используется также для лечения длительным сном и как противосудорожное средство, как успокаивающее и противоспастическое средство. Назначается по 0,025-0,05г 2-3 раза в день, часто в сочетании с папаверином, препаратами красавки и другие. Барбамил усиливает обезволивающий эффект местных анестетиков и поэтому может применяться вместе с ними для местного обезболивания.

Назначается барбамил также в клизмах и свечах. При сильном возбуждении и как противосудорожное барбамил применяется внутримышечно в виде 5% раствора в количестве от 5 до 10мл, иногда внутривенно(вводить медленно).

Rp. Barbamyli 0,1

D. t. d N. 6 in tabul.

S. По 1 таблетке за полчаса до сна

Rp. Sol. Barbamyli 5% 5,0

Sterilisetur!

DS. Внутримышечно 3-5 мл(при психическом возбуждении)

Rp. Barbamyli 0,05

Papaverini hydrochlorici 0,04

Extr. Belladonnae 0,015

Sacchari albi 0,2

M. f. pulv. D. t. d. N. 12

S. По 1 порошку 2-3 раза в день