

Пирилен(Pirilenum) это **белый кристаллический порошок** без запаха и вкуса, легко растворимый в воде. Пирилен оказывает ганглиоблокирующее действие, т.е. тормозит проведение возбуждения в симпатических и парасимпатических ганглиях.

Он обладает и гипотензивными свойствами. Применяется при гипертонической болезни, гипертонической энцефалопатии, спазмах периферических сосудов, язвенной болезни. Дозы следует индивидуализировать в зависимости от тяжести заболевания и переносимости препарата. Назначают его внутрь в таблетках. Начинают обычно с 1/2 таблетки(0,0025), а затем постепенно увеличивают дозу до 0,005г несколько раз в день. Рекомендуется начинать лечение в стационаре. Проводят лечение курсами в течение 2-4-6 недель с перерывами в 2-3 недели. При применении пирилена возможны побочные явления: сухость во рту, расширение зрачков, нарушение аккомодации, головокружение, общая слабость. В таких случаях следует уменьшить дозу или даже прекратить дачу препарата. Ввиду возможности ортостатического коллапса больные после приема пирелина должны находиться в лежачем положении в течении 1-2 часов. Вследствие частого возникновения запора и вздутия живота при лечении пириленом рекомендуется одновременное назначение слабительных и соответствующей диеты.

Противопоказаниями к применению являются резко выраженный атеросклероз, поражения миокарда, глаукома, нарушения функции печени и почек, атония кишечника и желудка.

Rp. Pirileni 0,005
D. t. d. N. 20 in tabul.
S. По 1/2 таблетки 2 раза в день