



Дикаин(Dicainum, Tetracaini hydrochloridum) это белый или со слабо желтоватым оттенком **кристаллический порошок без запаха**, горького вкуса. Растворы дикаина прозрачны, даже при длительном кипячении не разлагаются.

На языке вызывают чувство онемения. В присутствии щелочи дикаин выпадает в осадок, что надо иметь в виду при стерилизации хирургических инструментов.

Высшая разовая доза для анестезии верхних дыхательных путей 0,09г или 3мл 3% раствора(однократно).

Высшая разовая доза для перидуральной анестезии 0,075 или 25мл 0,3% раствора(однократно).

Дикаин применяется обычно как заменитель кокаина. Препарат обладает большей, чем кокаин, анестезирующей силой, быстро всасывается тканями, но значительно токсичнее. Поэтому, так же как и кокаин, он применяется только для поверхностной или концевой, терминальной, анестезии, обычно с прибавлением адреналина. В глазной практике применяют 0,25-0,5% растворы, в практике уха, горла и носа 1-2%(не более 3мл). Анестезия наступает через 1-3минуты и длится 20-40минут.

Rp. Sol. Dicaini 0,5% 5,0

Sol. Adrenalini hydrochlorici 0,1% gtts. II

DS. Глазные капли(для поверхностей анестезии по 2-3 капли в глаз)

Rp. Sol. Dicaini 1% 3,0

S. Для смазывания слизистых(анестезия)