



Дибазол(Dibazolium) это белый или со слегка сероватым или желтоватым оттенком **кристаллический порошок**

, горько-соленого вкуса. Трудно растворим в воде. Препарат можно вводить внутрь в течение довольно длительного времени, так как он не обладает кумулятивным свойством.

Дибазол, синтетический советский препарат, применяется при некоторых заболеваниях нервной системы как средство восстановительной терапии, а также как сосудорасширяющее и спазмолитическое средство.

Применяется при полиомиелите, мононевритах, например периферическом параличе лицевого нерва, при полиневрите. Назначается в порошках по 0,005г один раз в день или через день, всего 5-10 приемов. Принимают дибазол за 2 часа до приема пищи или через 2 часа после еды. Высшая суточная доза при лечении заболеваний нервной системы 0,015г. При применении дибазола в случаях гипертонии исчезают шум в ушах, пульсирующие головные боли, парестезии. Это улучшение более стойко, чем снижение кровяного давления. Препарат вводят при гипертонических кризах подкожно или внутривенно по 1-2-3мл 0,5% раствора. Применяется также при стенокардии, причем действие его длится дольше, чем нитроглицерина, хотя и наступает медленнее. Назначается 0,02-0,05г 2-3 раза в день внутрь или по 1-2мл 0,5% раствора. Курс лечения 12-14дней.

Высшая разовая доза 0,05г

Высшая суточная доза 0,15г