


Спазмолитин

Автор: Administrator

02.06.2012 10:42 - Обновлено 02.06.2012 11:01



Спазмолитин(Spasmolytinum) это **белый кристаллический порошок**, хорошо растворимый в воде. В водных растворах неустоек и легко гидролизуется.

Спазмолитин оказывает атропиноподобное действие, но в отличии от атропина не влияет на просвет зрачка, мало влияет на слюноотделение и на сердечную деятельность. Спазмолитин блокирует н-холинореактивные системы вегетативных ганглиев и центральной нервной системы, оказывая спазмолитический эффект. Вызывает расслабление гладкой мускулатуры внутренних органов и кровеносных сосудов, а также местную анестезию. Применяется при стенокардии, эндартеритах, пилороспазме, кишечных, печеночных и почечных коликах, а также при невралгиях, невритах, радикулитах. Назначается внутрь, чаще в капсулах или в таблетках, после еды по 0,1-0,05г 2-3-4 раза в день в течение 2-3-4 недель.

Иногда наблюдается побочные явления в виде головокружения, головной боли, чувства опьянения, сухости или анестезии во рту.

Rp. Spasmolytini 0.1

D. t. d. N. 10 in tabul.

S. По 1 таблетке 2 раза в день (после еды)