



Бемегрид(Bemegridum) это белый **кристаллический порошок** без запаха, горького вкуса, малорастворимый в воде.

Бемегрид является аналептиком. Действует стимулирующим образом на центральную нервную систему при различных видах угнетения дыхания и кровообращения. Является антагонистом снотворных, уменьшает токсичность барбитуратов и ноксирона.

Применяется при острых отравлениях барбитуратами одновременно с другими мерами помощи. Под влиянием бемегрида уменьшается токсичность барбитуратов, более быстро происходит восстановление рефлексов, сердечной деятельности, артериального давления и дыхания, ускоряется выход больного из коматозного состояния.

Кроме того, бемегрид применяется для устранения остановки дыхания и ускорения пробуждения при наркозе барбитуратами, тиобарбитуратами и другими наркотическими средствами(эфир, фторотан). Вводят бемегрид внутривенно(медленно!) в количестве 10мл 0,5% раствора. При отсутствии эффекта или при его недостаточности введение повторяют с интервалами в 3-4 минуты до нормализации всех угнетенных функций.

Число инъекции зависит от тяжести отравления. Обычно бывает достаточно 2-4 инъекции, но иногда требуется и больше.

Бемегрид можно сочетать с введением с введением мезатона, кофеина и других сердечно-сосудистых средств.

Ненаркотизированным больным бемегрид в качестве аналептика вводят в вену в количестве 2-5 мл 0,5% раствора.

Rp. Sol. Bemegridi 0,5% 10,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. Для внутривенных введений