Пентамин

Автор: Administrator
03.05.2012 17:42 - Обновлено 25.05.2012 11:16



Пентамин(Pentaminum) это белый или белый со слегка желтоватым **оттенком кристаллический порошок**
со слабым запахом, легко растворимый в воде.

Выпускается в ампулах по 2мл 5% раствора. Пентамин близок по действию к бензогексонию. Применяется при гипертонической болезни 1 и 2 стадии, гипертонических кризах, спазмах периферических сосудов, спазмах кишечника и желчных путей, почечных коликах, задержке мочеиспускания вследствие циститов и камней мочевого пузыря, острых приступах бронхиальной астмы. В хирургии используется для контролируемой гипотонии.
Вводят внутримышечно, начиная с 0,02(0,4мл 5% раствора) и постепенно увеличивая до 1-2мл 5% раствора 2-3 раза в день курсами по 3-6 недель. До инъекции и в течение 2 часов после нее больной должен лежать во избежание ортостатического коллапса. Для контролируемой гипотонии вводят внутривенно 2-5% растворы пентамина: мужчинам - 50-60мг, женщинам - 40-50мг. Артериальное давление измеряют каждые 5 минут. В случае надобности введение повторяют. Побочные явления сходны с таковыми у бензогексония.

Rp. Sol. Pentamini 5% 2,0
D. t. d. N 10 in amp.
S. Внутримышечно по 0,4мл 2-3 раза в день