



Октадин(Octadinum) это **белый кристаллический порошок** горького вкуса, мало растворимый в воде. Октадин является спазмолитическим веществом, т.е. блокирует передачу нервных импульсов в области окончаний симпатических нервов.

В отличие от адренолитических веществ на адренорецепторы. Под влиянием симпатолитических средств действие норадреналина и адреналина на адренорецепторы усиливается. Симпатолитические вещества, накапливаясь в окончаниях симпатических нервов, нарушают образование и выделение ими медиатора - норадреналина. Они нарушают проведение возбуждения в постганглионарных волокнах, но не влияют на передачу возбуждения в ганглиях.

Октадин оказывает ярко выраженное гипотензивное действие. В начале применения его может отмечаться некоторое повышение, а затем стойкое понижение кровяного давления. Октадин дает гипотензивный эффект у больных гипертензией в разных стадиях, даже в случаях со злокачественным течением. Назначается внутрь в таблетках по 0,01 и 0,025г. Дозы следует подбирать индивидуально. Обычно начинают с дозы 0,01г в день, а затем постепенно увеличивают ее до 0,025-0,05-0,075г в день(в несколько приемов). После достижения эффекта дозу уменьшают и применяют небольшие количества в течение длительного времени. Действие наступает через 2-4 дня после начала приема, достигает максимума через 7-8 дней и затем продолжается в течение 4-14 дней после прекращения дачи препарата. Лечение рекомендуется начинать в стационаре. Следует учитывать возможность значительных колебаний в чувствительности больных к препарату.

Из побочных явлений могут отмечаться при приеме октадина головокружение, слабость, диспепсия, отеки. Иногда наблюдается ортостатический коллапс. Возможно применение октадина в сочетании с другими гипотензивными средствами - резерпином,

Октадин

Автор: Administrator

04.05.2012 13:47 - Обновлено 25.05.2012 11:16

дихлотиазидом и др. Противопоказано применение октадина при резко выраженном атеросклерозе, острых нарушениях мозгового кровообращения, инфаркте миокарда, гипотонии и др.

Rp. Octadini 0,025

D. t. d. N. 20 in tabul.

S. По 1 таблетке 1 раз в день